

பத்திரிக்கை செய்தி

“பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகள் தெளிப்பது குறித்து வேளாண் பெருமக்களுக்கு ஓர் முக்கியமான வேண்டுகோள்”

தமிழ்நாட்டில் தற்பொழுது அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வேளாண் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றது. நெல், சோளம், கரும்பு மற்றும் பருத்தி ஆகிய பயிர்கள் வளர்ச்சி பருவம் முதல் அறுவடை நிலை வரை நிற்கும் பயிர்களாக உள்ளன. அனைத்து பயிர்களிலும் பூச்சி நோய் தாக்குதலுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை தற்பொழுது நிலவுகின்றது. நெற்பயிரில் இலைசுருட்டுப்புழு ஆணைக்கொம்பன் ஈ, குருத்து ஈ ஆகிய பூச்சிகள் இலைப்புள்ளி நோய், பாக்கிரியல் இலைக்கருகல் நோய், சூலைநோய், கழுத்துக்குலை நோய் தாக்குதலும் பருத்தியில் காய்ப்புழு, சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளும் தாக்க வாய்ப்புள்ளது.

வேளாண் பெருமக்கள் பூச்சி நோய் கண்காணிப்பினை சரிவர மேற்கொள்ளுவதுடன் பயிர்பாதுகாப்பு மருந்துகளை தேவையான அளவு பயன்படுத்துவதுடன் மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் பயிர்களுக்கு தெளிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

வேளாண் பயிர்களில் பூச்சிநோய் தாக்குதல் பொருளாதார சேத நிலைக்கு (ETL) மேல் இருக்கும் பட்சத்தில் பயிர்ப்பாதுகாப்பு மருந்துகளை தெளிக்க வேண்டும். இயன்ற வரை இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் மற்றும் பூஞ்சானங்களை (உதாரணம், பஞ்சகாவ்யா, ஜீவாமிருதம், வேப்ப எண்ணெய், வேப்பஞ்சாறு மற்றும் இயற்கை பூச்சி விரட்டிகள்) பயன்படுத்த வேண்டும்.

விளக்குப்பொறிகள் அதிக அளவில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஒரு ஏக்கருக்கு ஒன்று வீதம் வைத்து தாய் அந்துப்பூச்சிகளை அழிக்க வேண்டும். மஞ்சள் ஒட்டுப்பொறிகள் மற்றும் சூரிய ஒளி விளக்குப் பொறிகளை வைத்து தாய் அந்துப்பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம். டிரைக்கோகிராமா ஒட்டுண்ணிகளை வயல்களில் விடுவித்து புழுக்களை அழிக்கலாம்.

கிராசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் வேளாண்/தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலர்களின் ஆலோசனையை பெற்று அதிக வீரியமில்லா பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகளை பயிருக்கு தேவையான அளவு மட்டுமே கொள்முதல் செய்து அவற்றை பாதுகாப்பான முறையில் பயிர்களுக்கு தெளிக்க வேண்டும்.

பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகள் தெளிக்கும்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பின்வருமாறு:

#### செய்யக்கூடியது (Dos)

1. பயிருக்கு தேவையான சரியான மருந்துகளை சரியான அளவில் பயன்படுத்த வேண்டும்.
2. பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகளை காலை 10 மணிக்குள்ளும் மாலை 4.00 மணிக்கும் பிறகும் தெளிக்க வேண்டும்.
3. மருந்து கலக்கும் போது பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு தண்ணீரை கலந்து தெளிக்க வேண்டும். கைதெளிப்பான் எனில் 200 லிட்டர் தண்ணீரும் விசைத்தெளிப்பான் எனில் 60 லிட்டர் தண்ணீரும் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.
4. மருந்து தெளிப்பவர் (Spray Man) கையுறை, காலுறை, முக்கு, வாய் கவசம் கண்டிப்பாக அணிய வேண்டும்.
5. காற்று வீசும் திசையிலேயே மருந்து தெளிக்க வேண்டும்.
6. பூச்சிக்கொல்லி மருந்தினை விசைத்தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்கும் போது அதிகபட்சம் 10 டேங்க் மட்டுமே தெளிக்க வேண்டும். கைத்தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்கும் போது அதிகபட்சமாக 16 டேங்க் மட்டுமே தெளிக்க வேண்டும். அதற்கு அதிகமாக தெளிக்கும் போது உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

#### செய்யக்கூடாதவை (Don'ts)

1. பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகளை காலை 10 மணிக்கு மேலும் மாலை 4.00 மணிக்கு முன்னும் தெளிக்க கூடாது.
2. காற்று அடிக்கும் திசைக்கு எதிர் திசையில் மருந்து அடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
3. அளவுக்கு அதிகமான மருந்துகளை பயிர்களுக்கு தெளிக்க கூடாது.
4. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மருந்து தெளிப்பவர் அதிகபட்சம் 2 ஏக்கருக்கு மேல் மருந்து தெளிக்க கூடாது.
5. தரமற்ற மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகள் உபயோகிக்க கூடாது.

மேற்கண்ட முறைகளை பின்பற்றி பாதுகாப்பான முறையில் மருந்து தெளித்து பூச்சி நோய் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தி மனிதர்களின் உடல்நலம் பேணவும் பின்விளைவுகளை தவிர்க்கவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

11/01/2018  
மாஸ்டர் ஆட்சித் தலைவருக்காக

05/11/18  
செ.ம.தொ.  
வேலூர்- 9.